

MESURES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE

MISES EN PLACE POUR FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID-19

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

pass COVID-19
sanitaire

Dans le but de réduire les risques de transmission de la Covid-19, l'accès au Congrès nécessitera la présentation du Pass sanitaire.

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une **preuve sanitaire, parmi les trois suivantes** :

1 La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l'injection finale, soit :

- 7 jours après la 2^e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
- 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;
- 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection)

2 La preuve d'un test négatif de moins de 72h (ou 48h pour les tests antigéniques dans le cadre de voyages vers certaines destinations, comme la Corse, les collectivités d'outre-mer et l'Union européenne)

3 Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

PROTECTION DES PERSONNES



Port du masque obligatoire sur l'ensemble des espaces du Congrès et du Salon



Gel hydroalcoolique à disposition à l'entrée et dans les différents espaces

RESPECT DES MESURES BARRIÈRES



Distanciation de 1 m entre les personnes



Organisation et dimensionnement du **contrôle d'accès pour limiter les contacts**



Gestion des flux (afin de limiter les croisements)

- Distinction entrées/sorties,
- Marquage au sol et barrières physiques pour maintenir la distanciation
- Système de comptage pour réguler les flux et garantir un non dépassement des jauges maximales
- Plan de circulation
- Portes laissées ouvertes dans la mesure du possible

HYGIÈNE



Renforcement des protocoles de nettoyage et d'évacuation des déchets pour éviter tout risque infectieux



Accroissement de la **fréquence de nettoyage des sanitaires**



Nettoyage-désinfection des surfaces et zones de contact